

La fístula faringocutánea es la complicación postoperatoria más genuina de la laringectomía total. Su incidencia es muy variable según las distintas publicaciones al estar influenciada por múltiples factores.


Aunque existe cierta evidencia de que el uso del tubo de derivación salivar puede disminuir la incidencia de esta complicación, su uso no está estandarizado. Además, no existe un registro unificado en nuestro país de esta cirugía, ni del cáncer de laringe en general.

Por estos motivos, la Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo de la SEORL-CCC, promueve un estudio multicéntrico para comprobar la utilidad del tubo de derivación salivar (by-pass) en la prevención de la fístula faringocutánea tras laringectomía total que servirá como germen inicial para la recogida estandarizada de datos del cáncer de laringe y como proyección de futuro, de la creación de un registro nacional.

Comisión de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo SEORL-CCC



ESTUDIO MULTICÉNTRICO SOBRE LA UTILIDAD DEL TUBO DE DERIVACIÓN SALIVAR (BY-PASS) EN LA PREVENCIÓN DE LA FÍSTULA FARINGO-CUTÁNEA TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL



18 de mayo de 19:00 a 20:30 horas

Dr. Pablo Parente Arias / Dr. Pablo Torrico Román

Con la colaboración de:



Organizado por:

